



SAPS 3 Indlæggelses score			
Alle værdier måles fra 1 time før intensiv indlæggelsen til 1 time efter indlæggelsen			
		Point	Kommentar
Indlæggelse på intensivafdeling		16	Alle patienter har som udgangspunkt 16 point for at undgå negativ score
Alder (år)			
	<40 (default)	0	
	>=40 <60	5	
	>=60 <70	9	
	>=70 <75	13	
	>=75 <80	15	
	>= 80	18	
Indlæggelsestid på hospital før intensiv indlæggelse (dage)			
	<14 (default)	0	
	>=14 <28	6	
	>=28	7	
Overflyttes til intensivafdeling fra			
	Operationsgang (default)	0	
	Skadestue/ akut afdeling	5	
	Anden intensivafdeling	7	
	Anden afdeling herunder sengeafdeling	8	
Komorbiditet			
	Onkologisk behandling	3	Indenfor 6 måneder behandlet med strålebehandling, kemoterapi, immunterapi, steroid (>0,3 mg/kg/døgn prednisolon)
	Cancer	11	
	Hæmatologisk cancer	6	
	Kronisk hjertesvigt	6	NYHA IV
	Cirrose	8	Dokumenteret ved biopsi, eller kliniske symptomer: påviste varicer, tidligere påvist varice blødning, tidligere svært leversvigt/ encephalopathi, UL med retrograd flow i milt vene.
	AIDS	8	
Behandling inden indlæggelse på intensivafdeling, vasoaktiv medicin			



	Inotropi, vasopressor	3	
Akut/planlagt indlæggelse på intensivafdeling			
	Planlagt	0	
	Akut	3	
Årsag(er) til intensivindlæggelse			
KARDIOVASKULÆR			
	Andre (default)	0	
	Arytmi	-5	Hvis både arytmia og kramper scores kun krampe ( dvs -4 point)
	Hypovolæmisk hæmoragisk shock/non- hæmoragisk shock	3	Hvis både hypovolæmisk shock og akut abdomen scores dobbelt ( dvs 6 point)
	Septisk shock	5	
	Anafylaktisk shock	5	
	Ikke specifieret shock	5	
LEVERSIGT			
	Nej	0	
	Ja	6	
GASTROINTESTINAL			
	Andre GI / anden årsag (default)	0	
	Svær pancreatitis	9	
	Akut abdomen	3	
NEUROLOGI			
	Alle andre/ ingen neurologi (default)	0	
	Intrakraniel masse effekt	10	
	Fokal neurologisk udfald	7	
	Koma, stupor, delir, agitation	4	
	Kramper	-4	
Kirurgi før indlæggelse på intensivafdeling			
	Planlagt	0	
	Akut kirurgi	6	
	Ingen kirurgi	5	
Type kirurgi			
	Alle andre/ ingen kirurgi (default)	0	
	Transplantation A	-11	Lever, nyre, eller pancreas
	Transplantation B	-8	Nyre og pancreas ( kombination), og alle øvrige transplantationer
	Traume	-8	Thorax, abdomen, ekstremiteter



	Hjertekirurgi,	-6	Kun CABG uden klap kirurgi
	Neurokirurgi	5	Cerebrovaskulær katastrofe
Akutte infektioner ved intensivindlæggelsen			
	Nosokomial	4	Debut senere end 48 timer efter hospitalsindlægelse
	Respiratorisk	5	
	Alle andre (default)	0	
Estimeret Glasgow Coma Score, laveste (point)			
	3-4	15	Hvis sederet anvend laveste værdi forud for sedation. Hvis denne er ukendt estimer en score uden sedation.
	5	10	
	6	7	
	7-12	2	
	>=13 (default)	0	
Bilirubin, højste ( $\mu\text{mol/L}$ )			
	<34.2 (default)	0	
	>=34.2 < 102.6	4	
	>=102.6	5	
Temperatur, højeste (grader celcius)			
	<35	7	
	>=35 (default)	0	
Kreatinin, højeste ( $\mu\text{mol/L}$ )			
	<106.1 (default)	0	
	>=106.1 <176.8	2	
	>=176.8 <309.4	7	
	>=309.4	8	
Hjertefrekvens, højeste (pr min)			
	<120 (default)	0	
	>=120 <160	5	
	>=160	7	
Leukocytter, laveste ( $\times 10^9 \text{ l}$ )			
	<15 (default)	0	
	>=15	2	
Ph, laveste			
	<=7.25	3	
	>7.25 (default)	0	

# Dansk Intensiv Database – DID

15. juni 2016



Trombocytter, laveste			
	<20	13	
	>=20 <50	8	
	>= 50 <100	5	
	>=100 (default)	0	
Systolisk blodtryk, laveste (mmHG)			
	<40	11	
	>=40 < 70	8	
	>=70 <120	3	
	>=120 (default)	0	
Oxygenering, laveste værdi ( kPa)			
	PaO2/FiO2 <13,33 og MV	11	MV, mekanisk ventilation
	PaO2/FiO2 >=13.33 og MV	7	
	PaO2 <8 and no MV	5	
	PaO2 >=8 and no MV (default)	0	